

Числа Фибоначчи

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

рекуррентная ф-ла
 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$
 $F(n)$ - n-ое число Фибоначчи

я хочу найти общую формулу для чисел фибоначчи
 $F(n) = \dots$

$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$
 $F(k) = F(k-1) + F(k-2)$
 $F(n) + F(k) = F(k) + F(n)$


$a \cdot F(n) + b \cdot F(n) = (a+b) \cdot F(n)$

$w_1 = a^n$
 $w_2 = h^n$
 $w_3 = b^n$
 $w_1 + w_2 = w_2 + w_1$
 $k \cdot a^n + p \cdot a^n = (k+p) \cdot a^n$
 $5 \cdot (a^n + b^n) = 5 \cdot a^n + 5 \cdot b^n$

Векторное пространство

- $x + y = y + x$, для любых $x, y \in V$ (коммутативность сложения);
- $x + (y + z) = (x + y) + z$, для любых $x, y, z \in V$ (ассоциативность сложения);
- существует такой элемент $\theta \in V$, что $x + \theta = x$ для любого $x \in V$ (существование нейтрального элемента относительно сложения), в частности V не пусто;
- для любого $x \in V$ существует такой элемент $-x \in V$, что $x + (-x) = \theta$ (существование противоположного элемента относительно сложения);
- $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ (ассоциативность умножения на скаляр);
- $1 \cdot x = x$ (унитарность: умножение на нейтральный (по умножению) элемент поля F сохраняет вектор);
- $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ (дистрибутивность умножения на вектор относительно сложения скаляров);
- $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ (дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов).

↑ курс



$F(n) = x^n$
 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$
 $x^n = x^{n-1} + x^{n-2} \quad | : x^{n-2}$
 $x^n / x^{n-2} = x^{n-1} / x^{n-2} + x^{n-2} / x^{n-2}$
 $x^2 = x^1 + 1$
 $x^2 - x - 1 = 0$
 $d = 1 + 4 = 5$
 $x_1 = (1 + \sqrt{5}) / 2$
 $x_2 = (1 - \sqrt{5}) / 2$
 $F(n) = a \cdot x_1^n + b \cdot x_2^n$
 $F(n) = a \cdot [(1 + \sqrt{5}) / 2]^n + b \cdot [(1 - \sqrt{5}) / 2]^n$
 $F(1) = 1$
 $F(2) = 1$
 $F(1) = a \cdot [(1 + \sqrt{5}) / 2]^1 + b \cdot [(1 - \sqrt{5}) / 2]^1 = 1$
 $F(2) = a \cdot [(1 + \sqrt{5}) / 2]^2 + b \cdot [(1 - \sqrt{5}) / 2]^2 = 1$
 $a = 1 / \sqrt{5}$
 $b = -1 / \sqrt{5}$
 $F(n) = 1 / \sqrt{5} \cdot [(1 + \sqrt{5}) / 2]^n - 1 / \sqrt{5} \cdot [(1 - \sqrt{5}) / 2]^n$
 $F(n) = ([(1 + \sqrt{5}) / 2]^n - [(1 - \sqrt{5}) / 2]^n) / \sqrt{5}$

↑ курс

$ax^2 + bx + c = 0$
 $D = b^2 - 4ac$
 $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$

↑ курс
 базисные вектора x_1 и x_2

